



PERTUSSIS

ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
(13 ส.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Pertussis

สถานการณ์โรคไอกรนพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง กรณีการระบาด ปี 2566

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่
7 มกราคม 2567

324

ผู้ป่วยยืนยันรวม



5

เสียชีวิต



5

ยืนยันเพิ่มประจำวัน



173

เข้าข่าย



311

สงสัย



9


รอผล



จังหวัด	ยืนยันรวม	+เพิ่ม	เข้าข่าย	สงสัย	รวม	เสียชีวิต	พาหะ	รอผล
สงขลา	2	0	5	3	10	0	2	0
ปัตตานี	194	3	95	9	298	2	0	2
ยะลา	52	0	49	184	285	1	3	1
นราธิวาส	76	2	24	115	215	2	0	6
รวม	324	5	173	311	808	5	5	9

จำนวน (ราย)

■ ไม่ได้เลย ■ ได้น้อยกว่า 3 เข็ม ■ ได้อย่างน้อย 3 เข็ม ■ ไม่ทราบ



อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.

กลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรง

Admit 🏠

รวมทุกกลุ่มอายุ	<2๐	2๐-1 ปี	≥1 ปี
255 ราย	16 ราย	100 ราย	139 ราย


ปอดอักเสบ 🫁

รวมทุกกลุ่มอายุ	<2๐	2๐-1 ปี	≥1 ปี
97 ราย	10 ราย	38 ราย	49 ราย


ET Tube 🏠

รวมทุกกลุ่มอายุ	<2๐	2๐-1 ปี	≥1 ปี
17 ราย	4 ราย	8 ราย	5 ราย

สัดส่วนการได้รับวัคซีน DTP ในผู้ป่วย



ลักษณะการสัมผัส





กลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรง

ผู้ป่วยทั้งหมด 808 ราย

ผู้ป่วยนอก	553 ราย (68 %)
Admit	255 ราย (32 %)
เสียชีวิต	5 ราย (1 %)
ปอดอักเสบ	97 ราย (12 %)
ใส่ท่อช่วยหายใจ	17 ราย (2 %)

ผู้ป่วยเด็ก <2 เดือน 16 ราย

ผู้ป่วยนอก	0 ราย (0 %)
Admit	16 ราย (100 %)
เสียชีวิต	5 ราย (31 %)
ปอดอักเสบ	10 ราย (63 %)
ใส่ท่อช่วยหายใจ	4 ราย (25 %)



ผู้ป่วยเด็ก 2 ด – 1 ปี 165 ราย

ผู้ป่วยนอก	65 ราย (39 %)
Admit	100 ราย (61 %)
เสียชีวิต	0 ราย (0 %)
ปอดอักเสบ	38 ราย (23 %)
ใส่ท่อช่วยหายใจ	8 ราย (5 %)




อายุและอาชีพผู้ป่วยโรคไกรน เขต 12 (ยืนยัน+เข้าข่าย+สงสัย)

อายุมากที่สุด
84 ปี
อายุน้อยที่สุด
18 วัน
มัธยฐาน
3 ปี




สัดส่วนอาชีพของผู้ป่วย






ที่มา : โปรแกรม R506 สคร.12, โปรแกรม Event Based และ สสจ.



สถานการณ์โรคไอกรน (Pertussis) เขต 12 (13 ส.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567)







สถานการณ์โรคไอกรน (Pertussis) เขต 12 (13 ส.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567)

จำนวน (ราย)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0



20 พ.ย.

- เปิด EOC สคร.12 แจ้างปรับนิยาม และการจ่ายยา
- EOC สสจ.ปัตตานีเปิดเต็มรูปแบบ
- เปิด EOC อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

13 พ.ย.
เปิด EOC สสจ.ปัตตานี
(บางภารกิจ)

28 พ.ย. สคร.12 แจ้างมาตรการดำเนินงาน
และปรับเกณฑ์อายุการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ทั้งกลุ่ม
เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์

4 ธ.ค. เปิด EOC สสจ.ยะลา
6 ธ.ค. เปิด EOC สสจ.นราธิวาส

13 ธ.ค.
เปิด EOC เขตสุขภาพ
สั่งการกระตุ้นการฉีดวัคซีน
DTP, Tdap, aP ในกลุ่มเป้าหมาย

พบผู้ป่วยเสียชีวิต
นำไปสู่การค้นหาผู้ป่วย
เพิ่มเติม

กรม คร.
สนับสนุนวัคซีน Tdap
ให้จังหวัดปัตตานี
100 dose แรก

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.



พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

%Coverage DTP3 รายตำบล ปี 2566


ผู้ป่วยไทรอยด์ (รวมผู้ป่วยทุกประเภท)




ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วย	157 ตำบล
เป็นตำบลที่ %DTP3 ปี 66 < 90%	142 ตำบล (90.45 %)
ตำบลที่ %DTP3 ปี 66 70-90% และมีผู้ป่วย	40 ตำบล (25.48 %)
ตำบลที่ %DTP3 ปี 66 50-70% และมีผู้ป่วย	48 ตำบล (30.57 %)
ตำบลที่ %DTP3 ปี 66 < 50% และมีผู้ป่วย	54 ตำบล (34.39 %)

แผนที่ผู้ป่วยไกรสรสะสม (รวมผู้ป่วยทุกประเภท) เทียบกับ ตำบลที่พบผู้ป่วยยืนยันไกรสร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

รวมผู้ป่วย ยืนยัน+เข้าข่าย+สงสัย




ผู้ป่วยยืนยัน




ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2567
จำนวน 5 ราย

รายชื่อ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พื้นที่เดิม/ใหม่	อายุ	ประวัติวัคซีน	จำนวนเข็ม	ประเภท
1	ปัตตานี	หนองจิก	บางเขา	ผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่เดิม	3 ปี	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	Index
2	ปัตตานี	ปะนาเระ	ท่าข้าม	พื้นที่ใหม่	3 ปี	ได้แต่ไม่ครบ	1	Index
3	ปัตตานี	สายบุรี	มะนังดาลำ	พื้นที่ใหม่	3 ปี	ไม่ได้เลย	0	Index
4	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บุกิต	ผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่เดิม	4 เดือน	ไม่ได้เลย	0	Index
5	นราธิวาส	แว้ง	ขอเลาะ	ผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่เดิม	2 ปี	ได้แต่ไม่ครบ	1	ผู้สัมผัสใกล้ชิด

จำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ตามกลุ่มอายุ




พื้นที่พบผู้ป่วยยืนยัน




ผู้ป่วยยืนยันตามวันเริ่มป่วย ช่วง 6 สัปดาห์ล่าสุด

จังหวัด	ผู้ป่วยยืนยัน 6 สัปดาห์ตามวันเริ่มป่วย						รวม 6 Wk	ปัจจุบัน Wk53	รวม
	Wk47	Wk48	Wk49	Wk50	Wk51	Wk52			
สงขลา	0	0	0	0	0	2	2	0	0
ปัตตานี	21	22	20	18	23	10	114	1	2
ยะลา	7	6	6	9	13	3	44	0	1
นราธิวาส	6	8	7	13	0	1	35	0	6
รวม	34	36	33	40	36	16	195	1	9



มีพื้นที่ที่สามารถควบคุมโรคให้สงบใน 2 เท่าระยะพักตัว
 ในขณะเดียวกันมีพื้นที่ใหม่ที่มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นตลอด
 บ่งบอกว่ามาตรการในพื้นที่เกิดโรคแล้ว มีแนวโน้มสามารถควบคุมโรคได้
 แต่มาตรการในพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ป่วยอาจยังไม่เข้มข้นพอ


การควบคุมโรคให้สงบใน 2 Generation





จำนวนตัวอย่างส่งตรวจยืนยันโรคไกรณ และร้อยละผลบวกรายวันภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 10 กันยายน – 6 มกราคม 2567

จำนวนส่งตรวจ




วันรายงาน


ก.ย. 66	ต.ค. 66		พ.ย. 66	ธ.ค. 66		ม.ค.67
10 ก.ย 66 – 6 ม.ค. 67	ปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	สงขลา	เขตสุขภาพที่ 12	
จำนวนส่งตรวจ	632	213	341	34	1,220	
Positive	179	68	72	4	323	
% Positive	28.32	31.92	21.11	11.76	26.48	

ร้อยละผลบวกรายวัน วันที่ 10 กันยายน – 3 มกราคม 2567

เทียบกับยอดการฉีดวัคซีน DTP สะสม เดือนธันวาคม 2566



ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดเทียบกับผู้ป่วยยืนยันที่รักษาในโรงพยาบาลรายสัปดาห์ และยอดการฉีดวัคซีน DTP สะสม ในพื้นที่ 3 จังหวัด





Thank You